

哺乳びん、乳首などの除菌、器具類の除菌

Milton CP

— チャイルドブルーフ —

- ・本剤は飲まないでください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。



使用上の注意（必ずご使用の前にお読みください。）



子供の手の
届くところに保管
してはいけません



のむくすりでは
ありません

- (1) 本製品をあやまって飲みこんだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この外箱を持って医師に相談してください。
- (2) 目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この外箱を持って眼科医に相談してください。
- (3) 溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

販売名 Milton CP

用途、使用方法

哺乳びん、乳首などの除菌、器具類の除菌：水2L当たり1錠を溶かした液に1時間以上浸す。

「使用方法」に関する注意

- (1) 定められた「使用方法」を厳守してください。
- (2) 金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ・スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を溶液に浸けることも避けてください。メラミン食器等には、本製品の使用を避けてください。
- (3) 調製後、溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。
- (4) 液体タイプのミルトンや塩素系の洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は塩素ガスが発生することがあり、危険ですので避けてください。

成分及び分量

1錠(1.0g)中 ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム500mg
添加物：炭酸水素ナトリウム、アジピン酸、乾燥炭酸ナトリウム

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (3) 衣類等につくと脱色、変色ことがありますので注意してください。
- (4) 除菌する製品によっては印刷面(文字、絵)、材質などが変色・変質することがあります。

【製品お問い合わせ窓口】 0120-093610

受付時間 9:00~17:00 (月~金※土・日・祝 除く)

販売(輸入)元
杏林製薬株式会社
東京都千代田区大手町一丁目3番7号

0030AZ7KA